

# Repiderma

## Sprej med koppar och zink

- Grön sprej för skydd av skadad hud
- Innehåller kelatbunden koppar och zink
- Mikroniserade mineraler för optimalt upptag
- Lätt att använda

## Dosering/applicering

Repiderma är endast avsett för utvärtes bruk. Rengör huden noga innan Repiderma appliceras. Spreja på huden i cirka 3 sekunder. Spreja på cirka 15-20 centimeters avstånd, så att huden blir jämnt färgad. Upprepa vid behov efter 30 sekunder. Låt produkten absorberas i minst 30 sekunder. Se till att hålla huden torr efter applicering.


## VIKTIGT!



Skaka behållaren väl före användning



Spreja på 15-20 cm avstånd i cirka 3 sekunder



**Innehåller:** Zink- och kopparkelat

Mycket brandfarligt.

Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen ska förvaras i ett välventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från antändningskällor – rökning förbjuden. Undvik att andas in aerosolångor. Får bara användas i välventilerade utrymmen. Trycksatt behållare. Ska skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50° C. Får inte punkteras eller brännas. Inte heller när behållaren är tom. Sprejstrålen får inte riktas mot öppen eld eller glödande föremål.

Koppar och zink i Repiderma är kelatbundet. De kelaterade mineralen har mikroniserats med hjälp av den senaste nanotekniken. Mineralkelaten formuleras till partiklar som är högst 3 µm, det vill säga ungefär 25000 gånger mindre än ett sandkorn. Det leder till att partiklarna skyddar skadad hud och efter applicering förhindrar att skadliga ämnen tränger in i huden, vilket främjar sårhäkningsprocessen.



## Repiderma skyddar skadad hud

En sprejflaska med  
Repiderma innehåller  
cirka 75 doser.

